

Appel à communications - 7ème colloque international francophone de RISP



Appel à communications
Paris - 11 & 12 mars 2026

Coordonnées de l'auteur principal

Civilité

M.

Prénom

Antoine

Nom

Bihan

E-mail

axb44mail@gmail.com

Organisme

École des hautes études en santé publique (EHESP)

Unité / département

1. Ecole Des Hautes Etudes en Santé Publique, Département METIS, 15 Avenue du Professeur Léon Bernard, CS 74312, 35043 Rennes Cedex, France 2. Univ Rennes, EHESP, CNRS, Inserm, Arènes-UMR 6051, RSMS-U 1309, F-35000 Rennes, France

Adresse

10 Allée Jean Henri Fabre
La Baule, 44500
France

Informations générales

Sélectionner un type de soumission pour compléter les champs suivants.

Type de soumission

Communication orale

Axe du colloque

1/ Les inégalités sociales et territoriales

Titre du résumé

50 ans d'inégalités territoriales face au cancer du poumon : une histoire contrastée entre hommes et femmes.

Coordonnées de l'auteur

Coordonnées des co-auteurs

Nombre de co-auteurs

2

Co-auteur 1

Olivier Grimaud EHESP

Co-auteur 2

Nolwenn Le Meur EHESP

Détail du projet (poster & communication orale)

Contexte, Méthode, Résultats et Conclusions

Contexte : La réduction des disparités territoriales de santé est une priorité en France. L'objet de cette étude est d'étudier l'évolution des inégalités de décès par cancer broncho-pulmonaire (CBP). La prévention du tabagisme relève d'interventions nationales ou locales. Nous avons analysé l'évolution de la mortalité départementale entre 1968 et 2017, en identifiant l'évolution des composantes intra et inter-régionales des disparités.

Méthode : Analyse des décès par CBP chez les 35-74 ans en France métropolitaine (1968-2017). Calcul de ratios standardisés de mortalité, des coefficients de variation et modélisation multiniveau pour décomposer les variances intra et inter-régionales.

Résultats : La mortalité masculine décline après un pic en 1993, tandis que la mortalité féminine augmente de façon continue sur toute la période d'étude. Chez les hommes, les disparités territoriales diminuent de façon marquée, tout d'abord en raison d'une réduction des écarts intra-régionaux (jusqu'en 1992) puis d'une réduction des écarts inter-régionaux. Chez les femmes, les disparités augmentent jusqu'en 1988-1992 alors que la mortalité est faible. Les disparités diminuent ensuite, malgré une croissance marquée de la mortalité, avec des contributions égales des composantes intra et inter-régionales.

Conclusion : Les disparités ont fortement diminué chez les hommes, dans un contexte de croissance puis de diminution de la mortalité par CBP. La diminution marquée de la variance inter-régionale entre 1988 et 2008 est compatible avec un effet des politiques nationales antitabac des années 70 et 90. Ces dernières n'ont cependant pas empêché une croissance importante et homogène sur l'ensemble du territoire de la mortalité par CBP chez les femmes.

Message principal

Malgré des évolutions opposées de la mortalité (baisse chez les hommes, hausse chez les femmes), les disparités territoriales de mortalité par CBP se réduisent depuis 30 ans pour les deux sexes, suggérant un possible effet des politiques nationales.